



PRODUCTS



Tori Seeds[®]
tested & trusted





F1 হাইব্রিড করলা- মোতি (Moti)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: আকর্ষণীয় ফল, উচ্চ ফলনশীল জাত
 তীব্র শীত ব্যতীত সারা বছর চাষ করা যায়
 বপন সময়: সারা বছর চাষ করা যায়
 ফসল সংগ্রহ: বপনের ৫০-৫৫ দিন পর
 ফলের ওজন: ৮০-১০০ গ্রাম
 ফল: কাটা খাড়া, গাঢ় সবুজ
 বীজের হার: ৮০০-১০০০ গ্রাম/একর
 ফলন: ১২-১৪ টন/একর

F1 হাইব্রিড করলা- কোটি লং (Kothi long)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: দিবস নিরপেক্ষ হাইব্রিড জাত
 বপন সময়: সারা বছর
 ফসল সংগ্রহ: বপনের ৫০-৫৫ দিন পর
 ফলের ওজন: ২২৫-৩০০ গ্রাম
 ফল: গাঢ় সবুজ সমআকৃতির
 বীজের হার: ৭০০-৮০০ গ্রাম
 ফলন: ১৪-১৬ টন/একর



F1 হাইব্রিড শসা- দোলন-৩৭ (Dolon 37)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: তাপ ও খরা সহনশীল, আগাম জাত
 বপন সময়: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর
 ফসল সংগ্রহ: বপনের ৩২-৩৫ দিন পর
 ফলের ওজন: ২৫০-৩০০ গ্রাম
 ফল: আকর্ষণীয় সবুজ
 বীজের হার: ২৫০-৪০০ গ্রাম
 ফলন: ২৫-৩০ টন/একর

F1 হাইব্রিড শসা- অর্পা (Arpa)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: তাপ, খরা ও ভাইরাস সহনশীল
 আগাম জাত
 বপন সময়: সারা বছর
 ফসল সংগ্রহ: বপনের ৩৫-৩৮ দিন পর
 ফলের ওজন: ৩০০-৪০০ গ্রাম
 ফল: আকর্ষণীয় সবুজ
 বীজের হার: ২৫০-৪০০ গ্রাম
 ফলন: ২২-২৫ টন/একর





F1 হাইব্রিড টেঁড়স - নিকো (Niko)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: ভাইরাস মুক্ত উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত।

বপন সময়: সারা বছর

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৪২-৪৫ দিন পর

ফলের ওজন: ২৫-৩০ গ্রাম

ফল: সবুজ বর্ণের, ১২-১৫ সে.মি. লম্বা

বীজের হার: ২.০-২.৫ কেজি/একর

ফলন: ১০-১২ টন/একর

F1 হাইব্রিড লাউ- শোভা (Shova)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল জাত

বপন সময়: জানুয়ারি- অক্টোবর

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৫০-৫৫ দিন পর

ফলের ওজন: ২-৩ কেজি

ফল: সবুজ বর্ণের, সাদা দাগ যুক্ত

বীজের হার: ১.০-১.২ কেজি /একর

ফলন: ২৫-৩০ টন/একর



F1 হাইব্রিড চিচিঙ্গা- রেখা (Rekha)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল জাত, বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস, তাপ ও বৃষ্টিপাত সহনশীল

বপন সময়: জানুয়ারী-জুলাই

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৪০-৪৫ দিন পর

ফলের ওজন: ২২০-৩০০ গ্রাম

ফল: হালকা সবুজ বর্ণের সাদা ডোরাকাটা

বীজের হার: ৭০০-৮০০ গ্রাম

ফলন: ১৫-১৮ টন/একর

F1 হাইব্রিড ধুন্দল- জ্যোতি (Joti)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত। ফল হালকা সবুজ, মোলায়েম, আঁশবিহীন নরম ও সুস্বাদু

বপন সময়: জানুয়ারী-জুলাই

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৪০-৪৫ দিন পর

ফলের ওজন: ২০০-২২০ গ্রাম

ফল: হালকা সবুজ, নরম ও সুস্বাদু

বীজের হার: ৪০০-৫০০ গ্রাম

ফলন: ১৬-১৮ টন/একর





F1 হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া- টিনা সুইট (Tina Sweet)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: খরিফ মৌসুমে মাচায় চাষ উপযোগী, ভাইরাস সহনশীল

বপন সময়: আগস্ট -জানুয়ারি

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৫৫-৬০ দিন পর

ফলের ওজন: ৩-৪ কেজি

ফল: ফাঁপা কম, হলুদাভ কমলা শাঁস

বীজের হার: ৪০০-৫০০ গ্রাম /একর

ফলন: ২০-২২ টন/একর

F1 হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া- মিঠা (Methi)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া, পুরো মাংসল ও ওয়াইভিএমভি (YVMV) ভাইরাস সহনশীল

বপন সময়: আগস্ট-জানুয়ারি

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৬৫-৭০ দিন পর

ফলের ওজন: ৮-১০ কেজি

ফল: ফাঁপা কম, হলুদাভ কমলা শাঁস

বীজের হার: ৪০০-৫০০ গ্রাম /একর

ফলন: ২০-২৫ টন/একর



F1 হাইব্রিড বাঁধাকপি- টোরি গ্রীণ (Tori Green)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম হাইব্রিড জাত

বপন সময়: জুলাই-নভেম্বর

ফসল সংগ্রহ: রোপনের ৫৫-৬০ দিন পর

ফলের ওজন: ২-৩ কেজি

ফল: গাঢ় সবুজ, গোলাকৃতি ও নিরেট

বীজের হার: ২০০-৩০০ গ্রাম /একর

ফলন: ২০-২৫ টন/একর

F1 হাইব্রিড ফুলকপি- হোয়াইট বাবলি (White Babli)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: গরম ও বৃষ্টি সহনশীল হাইব্রিড জাত

বপন সময়: জুলাই-অক্টোবর

ফসল সংগ্রহ: রোপনের ৫৫-৬০ দিন পর

ফলের ওজন: ১.৫-২.৫ কেজি

ফল: আকর্ষণীয় সাদা, গম্বুজাকৃতি নিরেট

বীজের হার: ১৫০-২০০ গ্রাম/একর

ফলন: ২৫-২৮ টন/একর





F1 হাইব্রিড মূলা- হোয়াইট মোলি (White Mooli)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: আকর্ষণীয় সাদা বর্ণের মূলা, দ্রুত বর্ধনশীল ও নরম

বপন সময়: জানুয়ারি-অক্টোবর

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৩০-৩৫ দিন পর

ফলের ওজন: ২২০-২৩০ গ্রাম

ফল: সাদা বর্ণের, পাতা খাড়া

বীজের হার: ২-২.৫ কেজি /একর

ফলন: ২৫-৩০ টন/একর

F1 হাইব্রিড ওলকপি- টি এস এল-২৭ (TSL-27)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল আগাম হাইব্রিড জাত, বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস, তাপ ও বৃষ্টিপাত সহনশীল

বপন সময়: জুলাই-ডিসেম্বর

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৩৮-৪০ দিন পর

ফলের ওজন: ৩০০-৪০০ গ্রাম

ফল: খেতে সুস্বাদু, চ্যাপ্টা গোলাকৃতির, ফল হালকা

সবুজ,মোলায়েম আঁশবিহীন নরম ও সুস্বাদু

বীজের হার: ৩০০-৪০০ গ্রাম/একর

ফলন: ২২-২৪ টন/একর



F1 হাইব্রিড তরমুজ- সুইট সান (Sweet Sun)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: দ্রুত বর্ধনশীল হাইব্রিড জাত।

গাছ রোগ সহনশীল ও সতেজ

বপন সময়: মধ্য আগস্ট-জানুয়ারি

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৬০-৬৫ দিন পর

ফলের ওজন: ১০-১২ কেজি

ফল: সবুজ ডোরাকাটা, লম্বাটে ডিম্বাকার

বীজের হার: ২০০-২৫০ গ্রাম /একর

ফলন: ৩০-৩২ টন/একর

F1 হাইব্রিড তরমুজ- ইরা (Era)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: দ্রুত বর্ধনশীল হাইব্রিড জাত।

বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস, তাপ ও বৃষ্টিপাত সহনশীল।

বপন সময় সারা বছর

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৬০-৬৫ দিন পর

ফলের ওজন: ৩-৫ কেজি

ফল: গাঢ় সবুজ, লম্বাটে ডিম্বাকার

বীজের হার: ১৫০-২০০ গ্রাম /একর

ফলন: ২৫-৩০ টন/একর



F1 হাইব্রিড ঝিঙ্গা- সারি (Sari)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: দিবস নিরপেক্ষ হাইব্রিড জাত।
ভাইরাস প্রতিরোধী, গরম ও বৃষ্টিপাত সহনশীল জাত
বপন সময়: সারা বছর
ফসল সংগ্রহ: বপনের ৪০-৪৫ দিন পর
ফলের ওজন: ১৮০-২০০ গ্রাম
ফল: আঁশহীন, নরম ও সুস্বাদু
বীজের হার: ৩০০-৪০০ গ্রাম/ একর
ফলন: ১৪-১৬ টন/ একর



F1 হাইব্রিড মরিচ- সুকতারা (Suktara)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল আগাম হাইব্রিড জাত।
স্থানীয় জাতের চেয়ে বিভিন্ন প্রকার রোগ-বলাই,
গরম ও বৃষ্টিপাত অধিক সহনশীল।
বপন সময়: সারা বছর
ফসল সংগ্রহ: রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর
ফলের ওজন: ৫-৭ গ্রাম
ফলের আকার: ৮-৯ সে.মি.
ফল: সবুজ বর্ণের, ত্বক মসৃণ
বীজের হার: ১২০-১৫০ গ্রাম/ একর
ফলন: ১৫-১৭ টন/ একর



F1 হাইব্রিড টমেটো- সাকো (Sako)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: পঁচন ও পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস
রোগ সহনশীল, উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত
বপন সময়: আগস্ট-ডিসেম্বর
ফসল সংগ্রহ: রোপনের ৫৫-৬০ দিন পর
ফলের ওজন: ১০০-১২০ গ্রাম
ফল: গোলাকার শক্ত ও লাল বর্ণের
বীজের হার: ১১০-১২০ গ্রাম/ একর
ফলন: ৩২-৩৫ টন/একর



F1 হাইব্রিড টমেটো- টিএসএল-৩৫ (TSL-35)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: সংরক্ষণবান্ধব, তাপ সহনশীল জাত।
বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস রোগ (TYLCV) প্রতিরোধী।
বপন সময়: আগস্ট-নভেম্বর
ফসল সংগ্রহ: রোপনের ৬০-৬৫ দিনে
ফলের ওজন: ১২০-১৩০ গ্রাম
ফল: লাল বর্ণের শক্ত ও লম্বাটে
বীজের হার: ১০০-১২০ গ্রাম/একর
ফলন: ৪০-৪৫ টন/একর





F1 হাইব্রিড বেগুন- আভা গ্রীণ (Ava green)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত, ঢলে পড়া রোগ সহনশীল

বপন সময়: মে-জুলাই, ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী

ফসল সংগ্রহ: রোপনের ৫৫-৬০ দিনে

ফলের ওজন: ৩০০-৩৫০ গ্রাম

ফল: আকর্ষণীয় সবুজ বর্ণের ডোরাকাটা

বীজের হার: ১৫০-২০০ গ্রাম/একর

ফলন: ৩০-৩৫ টন/একর

F1 হাইব্রিড সূর্যমুখী- অর্ক (Arka)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল আগাম হাইব্রিড জাত,

বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪৫%,

বপন সময়: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর

ফসল সংগ্রহ: বপনের ১০০-১১০ দিনে

হেডের আকার বড় (২২ সে.মি.)

বীজের হার: ২-২.৫ কেজি/একর

ফলন: ১.৩-১.৫ টন/একর



F1 হাইব্রিড ধান- ইন্দোমোতী (Indomoti)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: গাছ মাঝারি খাটো, হেলে পড়ে না ও ধান বারে পড়ে না। চাল চিকন ও খেতে সুস্বাদু ও ভাত ঝরঝরে

দানার আকার: চিকন

বপন সময়: বোরো মৌসুম

ফসল সংগ্রহ: রোপনের ১১০-১২০ দিন পর

বীজের হার: ৬-৭ কেজি/একর

ফলন: ৪.৫-৫ টন/একর

জাতটি বাংলাদেশে পরীক্ষাধীন



F1 হাইব্রিড ধান- মালা-৬৫ (Mala-65)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত। গাছ হেলে পড়ে না, শীষে চিটা হয় না এবং ধান ঝড়ে পড়ে না।

দানার আকার: চিকন

বপন সময়: বোরো মৌসুম

ফসল সংগ্রহ: রোপনের ১০৫-১১২ দিন পর

বীজের হার: ৬-৭ কেজি/একর

ফলন: ৪-৫ টন/একর

জাতটি বাংলাদেশে পরীক্ষাধীন



F1 হাইব্রিড ভুট্টা- বিভা (Biva)

কে এম এইচ বি ৫৪৪

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: সর্বোচ্চ ফলনের হাইব্রিড ভুট্টা জাত। গাছ মাঝারি আকৃতির, দৃঢ় ও মোটা কাণ্ডবিশিষ্ট হওয়ায় গাছ হেলে পরে না।

বপন সময়: রবি ও খরিফ মৌসুমে

দানার রং: গাঢ় কমলা

ফসল সংগ্রহ: ১১০-১২০ দিনে

বীজের হার: ৬-৭ কেজি/একর

ফলন: ৬-৭ টন/একর



F1 হাইব্রিড ভুট্টা- কেসিও-৫০ (KCO-50)

কে এম এইচ বি ৫২৫

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত। শীত সহিষ্ণু, ভুট্টার মোচা বড় ও পরিপুষ্ট।

বপন সময়: অক্টোবর-ডিসেম্বর

ফসল সংগ্রহ: ১২০-১৩০ দিনে

দানার রং: গাঢ় কমলা

বীজের হার: ৬-৭ কেজি/একর

ফলন: ৭-৮ টন/একর



Produced & Exported by:

Batayan
AGRO TECH PVT. LTD.

Batayan-Orchid, 15/3 Naskarpara 1st bye-lane, Sonamukhi Road
Kolkata- 700061, INDIA. Phone : 00919903435323

Distributor:

JeoLife BioScience Limited

Shaleha Tower, L- 2/2 East Marul Badda, Dhaka- 1212, Bangladesh

Phone: +880 1318994425, Email: jeolifebioscienceltd@gmail.com, www.jeolife.com

toriseeds@gmail.com, www.toriseed.com

